

Transvaal Apotheek, Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag, Tel. 070-3469314, Fax: 070-3453569	Transvaal.apotheek@inter.nl.net	Geneesmiddeleninformatieblad
Tranlycypromine 10 mg tabletten Voor oraal gebruik		Pagina 1 van 3 Revisie: 0 Opgesteld door: AR



TRANLYCYPROMINE (ALS SULFAAT) 10 MG TABELTTEN

Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij dit middel voor u wil voorschrijven. Dit heet een artsenverklaring. De apotheek heeft de artsenverklaring nodig om het bij de fabrikant te bestellen. U krijgt het dan via de apotheek.

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij bepaalde vormen van depressie. Tranlycypromine regelt de hoeveelheid van onder andere noradrenaline en serotonine in de hersenen. Deze van nature voorkomende stoffen spelen een rol bij stellingen en emoties. Het kan 3 tot 4 weken duren voordat u effect merkt. Wordt uw klacht na een maand niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

- Als u allergisch of overgevoelig bent voor Tranlycypromine of voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Als u een feochromocytoom (tumor van de bijnier) heeft.
- Als u hartfalen heeft.
- Als u een aandoening aan de vaten van de hersenen heeft.
- Als u een ernstige leverziekte heeft.

Afdeling: Bereidingen	Opsteldatum: 16-12-2015	Autorisatie: PL	Autorisatiedatum: 04-08-2017
-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------

Transvaal Apotheek, Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag, Tel. 070-3469314, Fax: 070-3453569	Transvaal.apotheek@inter.nl.net	Geneesmiddeleninformatieblad
Tranlycypromine 10 mg tabletten Voor oraal gebruik		Pagina 2 van 3 Revisie: 0 Opgesteld door: AR



Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?

- Als u een operatie moet ondergaan. In verband met mogelijke wisselwerkingen met geneesmiddelen die tijdens de operatie gebruikt worden, kan het soms nodig zijn 2 weken van te voren de stoppen met dit medicijn. Bespreek dit met uw arts.
- Als u een hart- en vaatziekte heeft. Pijn op de borst kan worden onderdrukt door dit geneesmiddel en er kan schade aan het hart optreden zonder dat u het merkt.
- Als u ouder dan 65 jaar bent.
- Als u epilepsie heeft. Dit geneesmiddel kan een aanval uitlokken.
- Als u ooit verslaafd bent geweest aan alcohol of drugs.
- Als u in het verleden een manisch episode heeft doorgemaakt, als u schizofrenie heeft of als u suïcidale neigingen heeft of in het verleden heeft gehad.
- Als u een nierfunctiestoornis heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tranlycypromine 10 mg tabletten nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw apotheker of arts. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.

Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen:

- Andere geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen. De combinatie verstrekt de bijwerkingen slaperigheid en sufheid.
- Andere geneesmiddelen tegen depressie. De combinatie kan leiden tot een ernstige bijwerking met spiertrekkingen, trillen, koorts, zweten, verwardheid en opgewondenheid (serotonine syndroom) en mogen niet samen worden gebruikt. Als u een van deze geneesmiddelen na Tranlycypromine gaat gebruiken, kunt u 2 weken na het stoppen van Tranlycypromine beginnen. Als u stopt met Tranlycypromine en overgaat op een van deze geneesmiddelen, overleg dan met uw arts hoe lang u moet wachten voordat u kunt beginnen met Tranlycypromine.
- Dextrometorfan, tramadol, fentanyl, pethidine en oxycodon kunnen in combinatie met Tranlycypromine ook het serotonine syndroom veroorzaken.
- Amfetamine, dexamfetamine, methylfenidaat, dopamine, efedrine en fenylefrine kunnen in combinatie met Tranlycypromine een sterke stijging van de bloeddruk geven. Gebruik deze geneesmiddelen niet samen.

Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

autorijden?

Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid en wazig zien. U mag de **eerste week** dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1 week dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden. Na een week zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Let op: ook depressiviteit kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

alcohol drinken?

Alcohol versterkt de duizeligheid en het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan dit medicijn, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen: max 60 mg per dag

1 keer per dag in de ochtend of verdeeld over 2 toedieningen per dag.

Afdeling: Bereidingen	Opsteldatum: 16-12-2015	Autorisatie: PL	Autorisatiedatum: 04-08-2017
-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------

Transvaal Apotheek, Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag, Tel. 070-3469314, Fax: 070-3453569	Transvaal.apotheek@inter.nl.net	Geneesmiddeleninformatieblad
Tranlylcypromine 10 mg tabletten Voor oraal gebruik		Pagina 3 van 3 Revisie: 0 Opgesteld door: AR



Wijze van innemen:

Neem Tranlylcypromine 10 mg tabletten tijdens of net na een maaltijd of met wat voedsel in. U vermindert daarmee de kans op maagklachten.

Dit geneesmiddel wordt na het bereiken van effect gewoonlijk nog minstens 6 maanden gebruikt.

Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?

Als u teveel Tranlylcypromine 10 mg tabletten heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

- Als u dit middel **1 keer per dag** gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
- Als u dit middel **2 keer per dag** gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel

Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de arts heeft aangegeven.

Wanneer de behandeling met tranlylcypromine 10 mg tabletten voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren of kunnen klachten als slaapproblemen, prikkelbaarheids, angst en gedrags- en gevoelsproblemen ontstaan. De dosering moet daarom altijd langzaam worden afgebouwd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn:

- Duizeligheid, dit gaat meestal binnen enkele weken over
- Moeite met inslapen of doorslapen, deze bijwerking komt veel voor. U kunt deze bijwerking verminderen door in overleg met uw arts dit geneesmiddel niet later dan drie uur 's middags in te nemen.
- Seksuele stoornissen
- Droge mond
- Maag-darmklachten, zoals misselijkheid en diarree, dit gaat meestal binnen enkele dagen over.
- Sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, wazig zien
- Hoofdpijn
- Verwardheid, onrust en angst
- Gewichtstoename
- Allergische reactie zoals huiduitslag en jeuk

Krijgt u veel last van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit is te vinden op de verpakking.

Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer gebruikt.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is tranlylcypromine sulfaat.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn natriumcarboxymethylzetmeel, microkristallijne cellulose, lactose, magnesiumstearaat, siliciumdioxide en talk.

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tranlylcypromine 10 mg tabletten zijn witte, ronde tabletten van 9 millimeter in doorsnee. De tabletten zijn verpakt per 90 stuks in een tablettencontainer met sluitdop.

Deze geneesmiddeleninformatie wordt uitgegeven door de Transvaal Apotheek. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op augustus 2017.

Afdeling: Bereidingen	Opsteldatum: 16-12-2015	Autorisatie: PL	Autorisatiedatum: 04-08-2017
-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------